

芥菜

Jicai

本品为十字花科植物芥 *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic. 的干燥全草的炮制加工品。

【炮制】 取药材，除去杂质，抢水洗净，切段，干燥。

【性状】 本品呈不规则的段。主根较细，表面棕黄色，质较硬，切面黄白色。有的可见丛生的基生叶叶柄。茎纤细，易折断，表面黄绿色。叶片质脆，多皱缩，破碎，灰绿色至黄褐色，完整叶展开后呈披针形，边缘有缺刻或锯齿。茎梢偶见有白色小花。短角果呈倒三角形或倒卵状三角形，扁平，有细柄，淡黄绿色。气微，味淡。

【鉴别】 (1) 本品粉末黄绿色至深黄色。非腺毛为单细胞分枝状，3~5分枝，呈海星状，细胞壁有疣状突起。气孔不定式，副卫细胞3~4个。

(2) 取本品粉末0.5g，加甲醇30ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取芥菜对照药材0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各5 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上。以二氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-甲酸（12:2:1:0.8）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以2%三氯化铁溶液-1%铁氰化钾溶液（1:1）（临用新配），放置至斑点显色清晰，在日光下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过12.0%（《中国药典》2020年版四部通则0832第二法）。

总灰分 不得过14.0%（《中国药典》2020年版四部通则2302）。

酸不溶性灰分 不得过2.5%（《中国药典》2020年版四部通则2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020年版四部通则2201）项下的热浸法测定，不得少于17.0%。

【性味与归经】 甘、淡，凉。归肝、脾、膀胱经。

【功能与主治】 清热利湿，平肝明目、凉血止血，和胃消滞。用于肾炎水肿，尿痛，尿血，便血，月经过多，目赤肿痛，小儿乳滞，腹泻，痢疾，乳糜尿，高血压。

【用法与用量】 9~15g。

【贮藏】 置干燥处。

饮片 枳椇