

# 安痛藤

## Antongteng

本品为葡萄科植物毛叶白粉藤 *Cissus assamica*(Laws.) Craib 的干燥藤茎的炮制加工品。

**【炮制】** 取药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片或段，干燥。

**【性状】** 本品呈类圆柱形的厚片或段，直径 0.3~1.8cm。外表面黑褐色或灰褐色，小枝有纵棱纹，有的老枝可见红褐色点状突起的皮孔；节部稍膨大，可见枝痕。切面皮部窄，木质部黄褐色或淡黄色，射线辐射状，导管孔眼明显，木部易纵向片状分离，中心髓部红褐色，亦有黄白色。气微，味淡，口尝有滑腻感。

**【鉴别】** 本品粉末黄褐色。纤维成束或散在，黄色，末端渐尖，壁稍厚，纹孔斜裂缝状。石细胞成群，类方形或椭圆形，直径 17~97 $\mu\text{m}$ ，壁不均匀增厚，纹孔及孔沟明显。草酸钙簇晶直径 12~48 $\mu\text{m}$ ；草酸钙针晶成束，长约至 161 $\mu\text{m}$ 。具缘纹孔及网纹导管多见，环纹、梯纹导管少见，偶见螺纹导管。

**【检查】** 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 7.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）

浸出物 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 17.0%。

**【性味与归经】** 淡、微涩，平。归肺、胃经。

**【功能与主治】** 祛风止痛，舒筋活络，拔脓消肿。用于跌打损伤，扭伤，风湿关节疼痛，骨折，痈疮肿毒。

**【用法与用量】** 6~9g。

**【贮藏】** 置干燥处。