

稽豆衣

Ludouyi

本品为豆科植物野大豆 *Glycine soja* Sieb.et Zucc.的干燥黑色种皮的炮制加工品。

【炮制】 取药材，除去杂质，或干燥。

【性状】 本品呈不规则的卷曲碎片，外表面棕黑色或黑色，种脐椭圆形。内表面暗灰色或暗棕色，光滑。质脆。气微，味淡。

【鉴别】 (1) 本品粉末灰褐色。种皮栅状细胞紫红色，侧面观细胞1列，长50~80 μm 壁厚，其光辉带；表面观呈多角形或长多角形，直径约18 μm。种皮支持细胞1列，侧面观呈哑铃状或骨状，长26~185 μm，表面观呈类圆形或扁圆形，直径10~28 μm。

(2) 取本品粉末2 g，加甲醇30 ml，加热回流30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1 ml使溶解，作为供试品溶液。另取黑大豆衣对照药材2 g，同法制成对照药材溶液。再取大豆苷元对照品，加甲醇制成每1 ml含1 mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2020年版四部通则0502)试验，吸取供试品溶液和对照药材溶液各5 μl，对照品溶液1 μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水-乙酸(70:30:10:1)的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，在紫外光(365 nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过13.0%(《中国药典》2020年版四部通则0832第二法)。

总灰分 不得过5.0%(《中国药典》2020年版四部通则2302)。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法(《中国药典》2020年版四部通则2201)项下的热浸法测定。不得少于15.0%。

【性味与归经】 甘，平。归肝、肾经。

【功能与主治】 养血疏风。用于阴虚烦热，盗汗，头晕，目昏，风痹，肾虚水肿。

【用法与用量】 9~15g。

【贮藏】 置干燥处。

本草綱目