

石耳

Shi'er

本品为石耳科植物石耳 *Umbilicariaesculenta* (Miyoshi) Minks 的干燥地衣体的炮制加工品。

【炮制】 取药材，除去杂质，洗净，干燥。

【性状】 本品呈不规则的片状，多皱缩卷曲或破碎，完整者平展后直径3~7cm，常不平坦。上表面灰褐色，较光滑；下表面近黑色，密具茸毛状或颗粒状细突起或局部脱落而呈光秃状，革质，稍坚韧，易撕裂，断裂处可见白色髓层，中央或偏中央位置具一脐状着生点突起，直径5mm左右。气微，味淡。

【鉴别】 取本品粉末约2g，加乙醇20ml，浸泡30分钟，超声处理10分钟，放冷，滤过，取滤液5ml，加三氯化铁试液2~3滴，溶液显葡萄酒红色。

【检查】 水分 不得过13.0%（《中国药典》2020年版四部通则0832第二法）。

总灰分 不得过7.0%（《中国药典》2020年版四部通则2302）。

酸不溶性灰分 不得过5.5%（《中国药典》2020年版四部通则2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020年版四部通则2201）项下的热浸法测定，不得少于26.0%。

【性味与归经】 甘，平。归肺、大肠经。

【功能与主治】 养阴，止血。用于劳咳吐血，肠风下血、痔漏。

【用法与用量】 4.5~9g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。